


Critères d'abstention de réanimation cardio pulmonaire

Cours BLS-AED PCi 2016

(Information destinée aux cadres)



1Mort évidente :

- Les **lividités cadavériques fixes**: sont une coloration rouge à violacée de la peau liée à un déplacement passif de la masse sanguine vers les parties déclives du cadavre.
- La **rigidité cadavérique**, ou ***rigor mortis*** en latin, est un enraidissement progressif de la musculature causé par des transformations biochimiques irréversibles des fibres musculaires durant la phase *post-mortem* précoce. Cet état disparaît habituellement lorsqu'apparaît la décomposition, c'est-à-dire au bout de deux à quatre jours selon les circonstances.
- **décomposition**
- **décapitation**
- **écrasement majeur du thorax**
- **perte de substance cérébrale importante**

Mort violente ou indéterminée : il faut penser à préserver les preuves pour le travail de la Police

²D'un point de vue éthique, certaines réanimations sont conduites pour prendre le temps de comprendre, pour valider les manœuvres des témoins ou pour conforter l'entourage de la victime



Débuter toujours une réanimation cardio-pulmonaire dans les cas suivants : pédiatrie, femme enceinte, hypothermie, noyade, suspicion d'intoxication. Ces situations nécessitent la poursuite de la réanimation et le transport vers le milieu hospitalier.

Source : CORFA 2015 (Commission Romande de Formation Ambulancière)

